

Ficha Técnica BACTO-STOP

TIPO DE PRODUCTO: Cápsulas que contienen un bacteriostático eficaz contra la mayoría de las infecciones de los peces (ataque bacteriano), por ejemplo la podredumbre de las aletas producida por Flexibacter, septicemias hemorrágicas (muerte con abdomen hinchado), úlceras, Exophtalmia Bacteriana (ojos saltones), etc. Cada cápsula contiene 400 miligramos de Oxitetraciclina.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA FÓRMULA: Las cápsulas contienen el antibiótico en polvo para garantizar que el producto llegue en condiciones idóneas al domicilio del usuario, ya que las soluciones acuosas son inestables. Se aplica por vía oral o disuelto en el agua siendo esta modalidad la más empleada. Es preferible realizar el tratamiento en una cuba aparte del acuario, por higiene. Si se utiliza en el acuario es necesario renovar el agua totalmente tras el tratamiento.

USO: SE recomienda siempre prolongar el tratamiento al menos durante las 24 horas posteriores a la total desaparición de las síntomas, y proveer una alimentación rica o vitaminada al final del mismo, junto con unas condiciones óptimas del agua. Reseñamos a continuación las modalidades de tratamiento y concentraciones recomendadas de **BACTO-STOP**.

1. Disuelto en el agua: Como norma general aplicaremos los tratamientos en cubas limpias y con el agua en buenas condiciones, mejor con filtro de esponja aunque retirando el carbón u otras materias adsorbentes. En estas condiciones vierta en la cuba el contenido de una cápsula por cada 20 litros, prolongando el baño durante dos a seis días sin necesidad de añadir nuevas dosis. Proteja la cuba de la luz, y proceda inmediatamente a un cambio total de agua, con adición de una nueva dosis, si el color del baño vira del amarillo al pardo o negruzco, lo que indica la degradación del activo. ES preferible aplicar los tratamientos en agua BLANDA o de dureza MEDIA. Si solo dispone de agua DURA aplique dosis doble de antibiótico. Tenga en cuenta que una oxigenación excesiva de las cubas así como la temperatura y luz pueden acelerar la degradación del activo.

2. Por vía oral: La dosis de Oxitetraciclina por vía oral es de 20 a 60 miligramos por día y Kg de peso de animal. Se comprende la dificultad de suministrar esta dosis a peces pequeños, a menos que se añada a la comida, calculando la cantidad que el animal puede comer en un día...

COMBINACIÓN CON OTROS FÁRMACOS: Se combina con el **HEXA-PULL** sumando las dosis respectivas, para tratamiento simultáneo de bacterias y parásitos internos, y mayor eficacia contra un espectro amplio de bacterias incluyendo Gram Negativas y Anaerobias. También eficaz dicha combinación contra el Punto Blanco cuando resulta recalcitante o difícil de eliminar con otros productos.

REFERENCIA	PARA LITROS
BACTO - 12 cápsulas	240



El tamaño de envasado:

**BACT-STOP
-12 Cápsulas**